Bia

Vass4R07s481-485



INRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp116

A SEPTIME

Bra Alexano h R7 s 481-485







Nº d'ordre :

Désignation : Bea

Emplacement: 4 R 4 b. 481-485

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui (82) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux (90) - sans villosité pubescente (18) - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou ouivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre (34 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

50/97

N° d'ordre :

Désignation: Bia.

Emplacement: 4 R 7 S. 481-485.

#### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte (60) - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.)

#### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moven - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

JU197

## Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Nom cépage :

Code cépage

Bia Marie

Code clone

Emplacement: 4 R7 481-485

Observateur : Lacombe

#### Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 3- grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3)- orbiculaire 4 - réniforme 5. oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5)- vert foncé 7. oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2) rouge jusque première bifurcation (3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9 oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1)- présente 9 oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière (2)- involuté 3 - révoluté (4)- tourmenté 5. oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible (3)- moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible(3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible (3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3)moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087\* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible (3) moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente (1) - présente 9

#### Pétiole

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9.

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible(1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés: nulle ou très faible(1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1/- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176

# Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année: 1999	Observateur :
Code cépage : Code clone :	
Nom cépage: Bria.	Emplacement: 4 R7 s481-485
No.	·
Nom cépage: Bra Marie No Grape	Emplacement: 4 R7 s481-485
oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 courte (1	10-15cm)(3) - moyenne (15-20cm) 5 - longue
(20 20 ) 7 +->-   (>20 ) 0	MR)
oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-1	0cm) 3)- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-
20cm) 7 - très large (>20cm) 9.	Α,
oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne	(5)- compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 <b>longueur pédoncule</b> : très court (<2cm) 1 -	court (2-4cm)(3 ) moyen (4-7cm)(5) long (7-
10cm) 7 - très long (>10cm) 9.	9
oiv 207 lignification du pédoncule : base seulemen	t 1 - moitie 54 plus de la moitie 7.
oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramid	lale 2)
oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 une aile	2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.
0.1	
<u>Baie</u>	
oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8	2-14mm) 3 - movenne (14-20mm) 5 - longue
(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.	17 Ningto
oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-	14mm) 3 - movenne (14-20mm) 3- large (20-
26nm) 7 - très large (>26mm) 9.	17
oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme l	- uniforme 3
oiv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 elliptique 3 -	ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -
cylindrique 7 - arquée 8.	
oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - r	ouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noit 6.
oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniform	ne I - uniforme 2.)
oiv 227 <b>pruine</b> : nulle ou très faible 1 - faible 3 - mo	ovenne 5) forte 7 - très forte 9.
oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3	moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9.
oiv 229 ombilic : peu apparent 1) apparent 2.	
oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée ) co	olorée 2.
oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée	coloration faible 3 - coloration movenne 5 -
forte coloration 7 - très forte coloration 9.	
oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2	2.
oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible	(<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.
oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3- moy	yenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.
oiv 236 saveur : aucune Q- goût muscat 2 - goût fo	xé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.
oiv 236* saveur : aucune 1 - goût muscat 2 - goût f	foxé 3 - autre 4.
oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 -	court (4-8mm)(3) moyen (8-12mm) 5 - long
(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.	
oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - faci	ile 3 - moyer(5 -) difficile 7 - très difficile 9.
oiv 241 présence de pépins : absents type corinthie	en 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3.)
oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 -	moyens(5)-longs 7 - très longs 9. + mm
oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins	secs): très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -
moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65n	ng) <sup>9</sup> .
oiv 244 cannelures transversales face dorsale pép	ins : absentes D- présentes 2.
oiv 244 cannelures transversales face dorsale pép	oins : absentes(1)- présentes 2.

#### Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

2000 Année

Observateur

Code cépage :

Nom cépage

Code clone

Emplacement: 4 R7 x481-485

#### Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence 1 - présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (~17mm) 9

#### Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible I - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 élevé 7 très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3